

炭酸ガス(CO₂)レーザー治療 (保険外診療)

■CO₂レーザーとは

CO₂レーザーは、CO₂=炭酸ガスを使用した遠赤外線を原理とした光を発する気体のレーザーです。

CO₂は水に吸収されやすい特徴があり、皮膚には水分が多く含まれているため、いぼ・ほくろなどにレーザーを照射すると、細胞の内側の水分に反応して熱エネルギーが発生します。この熱エネルギーによっていぼやほくろを瞬間的に気化蒸散させて取り除くことができるのが特徴です。熱影響が限局的なので、周辺の正常部位への影響も少なく抑えられます。

■適応症状

- 脂漏性角化症 老人性疣贅 (いぼ) 母斑細胞母斑 (ほくろ)
- アクロコルドン (首のイボ) 稗粒腫、汗管腫
- 感染性陥入爪 鶏眼 尖形コンジローマ など

■施術の流れ

① 洗顔・クレンジング

メイクや汚れ、皮脂をしっかりと落とします。

② 局所麻酔

痛みを最小限で施術できるようにいたします。痛みに弱い方もご安心下さい。

③ 照射

(ほくろの場合は1個あたり5~10分程度、いぼの場合は数分程度)

麻酔を使用した場合は外用麻酔が十分に効いてから、CO₂レーザーの照射を行います。ところによりチリチリと熱い感覚がある場合があります。焦げ臭いにおいがありますが皮膚を蒸散する際に生じるものでご心配いりません。

④ 終了

施術部位を保護するため、医療用のテープを貼って終了です。お薬を塗布します。

お化粧品は施術部位以外は直後よりしていただけます。洗顔・入浴は当日から可能ですが、施術部位をこすらないようにご注意ください。

■治療後の経過 (ダウンタイム)

施術部位は赤色を呈し、陥没している状態になります。照射後2~3日はまだ赤みがあり、表面が乾いてきます。約2週間で皮膚が再生し上皮化するので、その間は軟膏処置を継続して患部を乾燥させないことが重要です。軟膏処置をすることにより痕は数倍きれいに治ります。

施術部位が上皮化してテープが不要になった後は、保湿と日焼け止めを塗り紫外線対策を十分におこなってください。また、症状・経過によってはCO₂レーザー後の色素沈着の予防のために、ハイドロキノンの使用をすることがあります。盛り上がりを抑えるためにステロイド外用薬を使用することもあります。

治療後の赤みや黒ずみは、施術部位の状態により異なりますが、1~3か月以内に自然に消えます。大きいものでは、半年~稀に1年程度続くこともあります。徐々に消失しますのでご安心ください。

時に照射部位が照射後2~3週間後より赤みを増して盛り上がる場合もありますが通常は数か月で落ち着いてきます。場合によっては注射で早目に平らにすることもできます。

■予想される合併症等の危険性

- ・ 局所麻酔薬の副作用が出る場合があります（じんま疹、動悸、痙攣、ショックなど）。
- ・ 再発することがあります（ほくろの細胞が深いところまである場合には再発してくることがあり繰り返しの照射が必要な場合もあります）。
- ・ 術後、創部に出血及び感染をきたすことがあります。
- ・ まれに傷痕（瘢痕）が残ることがあります。

■来院目安

1回で取れるものが多いですが、色素の深いほくろやウィルス性のいぼなど、状態によっては複数回かかるものもあります。また、治療後1~2週間後の再受診をおすすめしています。

■禁忌

- ・ 妊娠中の方
- ・ ケロイド体質の方
- ・ 日焼け直後、あるいは過度な日焼け状態の方。治療後日焼けする可能性のある方
- ・ 皮膚炎・皮膚感染症のある方
- ・ その他医師が施術不可能と判断した方

※美容用の糸や金属板、シリコンプロテーゼが入っている場合には施術が受けられない可能性がございます。カウンセリング時にお申し出ください。

※詳細につきましては医師にお尋ね下さい。

■料金（税込）

（別途、初再診料、必要に応じて薬剤料がかかります）

○ほくろ（3か月以内再発の場合は無料で再度治療します）

- ・ 3mm未満 6,600円
- ・ 3-5mm 8,800円
- ・ 5mm超えた場合は1mmごとに1,100円

○いぼ

- ・ 老人性いぼ 6,600円(1か所5mmまで)(1mmごとに+550円)
- ・ 首の小さいいぼ(アクロコルドン) 1個880円 30個22,000円